

Unterscheidung von Traubeneiche und Stieleiche

Merkmal	Traubeneiche	Stieleiche
Blattvorderseite		
Blattunterseite		
	Blätter an beiden Seiten mit 5-7 dreieckigen, gerundeten Lappen, die ziemlich <u>symmetrisch angeordnet</u> sind, um 2 cm lang gestielt, im Umriß oval-länglich, 8-12 cm lang und bis ca. 5 cm breit. Vorne rundlich am Grunde keilförmig verschmälert und nicht geöhrt. Etwas lederig, oberseits dunkelgrün, unterseits heller, kahl, nur in den Blattnervenwinkeln mit kleinen Haarbüscheln. Laubaustriebe ca. 14 Tage später als bei der Stiel-Eiche. Insbesondere bei kleineren Exemplaren bleibt die trocken-braune Belaubung oft bis zum nächsten Frühjahr am Baum.	An beiden Seiten mit 5-7 rundlichen, glattrandigen Lappen, die ungefähr bis zur Spreitenmitte eingeschnitten sind. <u>Am Blattgrund deutlich geöhrt</u>, etwa 7-12 cm lang und bis 8 cm breit. Stiel nur 2-7 mm lang. Blätter lederig, oberseits kräftig grün, leicht glänzend, unterseits heller, auf den Blattnerven leicht behaart. Laubaustrieb ca. 14 Tage früher, als die Traubeneiche. Herbstfärbung kräftig gelb bis bräunlich.
Blattgrund		
Frucht		